

CAROLI ALLIONII

AUCTARIUM

AD SYNOPSISIM METHODICAM STIRPIUM

HORTI REG. TAURINENSIS.

1772

Exhibet hoc opusculum enumerationem plantarum, quibus Hortus Regius Taurinensis auctus est ab anno 1762, quo prodit Miscellaneorum Taurinensium Tomus alter. Ut autem in hoc auctario commode Tyrones, & Botanici stirpes, quas addidi, reperire possint, paucis omnino mutatis eandem methodicam dispositionem servavi, similiterque species ad Linnaea genera tenaciter retuli. Nominibus quoque trivialibus usus sum Cl. LINNAEI, sed illae stirpes, quas LINNAEUS non habet, indicantur nominibus, quae a Cl. Viris JACQUIN, & GRANTZ mutuatus sum, aut ipse assignavi, si nullum adhuc haberent. Opportunum porro judicavi huic auctario iterum inferere stirpes quasdam in synopsi jam recensitas, quae nullum tunc temporis triviale nomen habebant. Quae minus notae aut novae sunt, brevi descriptione ita definiuntur, ut saltem certo nunc internosci possint; alio autem loco, & copiosius, & icone illustrabuntur.

BIBLIOTECA
ORTO BOTANICA
PADOVA
808 681 (15a)

YUN
Allionii C. " floribus ad ripam...

verificati: è l'estratto del
Lavoro pubbl. m.
Miscellanea Taurinensium, Tomo V
T = Mélanges de la Société Royale
bibliothèque de la Société des Sciences
de Turin pour les années 1770-
1772 J. P. 53-36

Anacardium occidentale L.
 Arbutus unedo L. *
 uva ursi L. *
 alpina L. *

CLASSIS II.

Plantae flore monopetalo
 flosculofo.

X. POLYSTEMONES.

Mimosa plena L.
 asperata L.
 casta L.
 nilotica L.
 arborea L.
 Poterium sanguisorba L. *
 hybridum L.
 spinosum L.
 Styrax officinale L. *

I. ANTHERIS DISJUNCTIS

Dipacus fativus.
 Scabiosa cretica L.
 ucranica L. (52) *
 transylvanica L. *
 prolifera L.
 gramuntia L.
 africana L.
 filvatica L. *
 palaestina L.
 marilandica. (53) *
 Globularia cordifolia L. *
 alypum L. *
 nudicaulis L. *
 Cephalanthus occidentalis L.

(52) *Scabiosa foliis planis carnosis, inferioribus pinnatis, ramorum integerrimis linearibus* GMEL. lib. II. p. 213, & Misc. Taur. p. 38.
 Hoc nomine ex Anglia primum, deinde etiam ab amico optimo Ioh. MARSILLI Bot. Prof. Patavino missa scabiosa est diffuse ramosa similis ucranicae, sed ab ea vere differens. Humilior est foliisque habet omnia pinnata. Flores uniformes vix inaequales segmentis erectis, quinquefidi, breviores calyce floris, qui petiolatus est in quinque aristas rigidas rubentes florem superantes divisus. Calix fructui immediate impositus membranaceus planus 5 dentatus, & dentibus longe aristatis. Est ne *scabiosa divaricata* Cl. JACQUIN in horto Vindobonensi? Decernere non licet cum splendidum hoc opus nondum possideam. Nostrae seminibus respondent semina ab hoc Illustri viro sub hoc nomine accepta, quae in horto sata non germinarunt.